

Bijlage 1: referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt (art. 61/3, § 1)		
Type aandoening	Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia	Wachttijd vanaf einde actieve behandeling van de kankeraandoening en zonder herval
Teelbalkankers	Zuivere seminomen, stadium I Zuivere seminomen, stadium II	3 jaar 6 jaar
	Niet-seminomen of gemengde tumoren, Stadium I en II	6 jaar
Borstkankers	Lobulair of ductaal carcinoom <i>in situ</i> , zonder micro-infiltratie Behandeling volgens consensus HAS/INCa  Ductaal carcinoom <i>in situ</i> dat bij chirurgische excisie een of meer micro-invasieve zones vertoont (scheur van het basale membraan) van niet meer dan 1 mm (langs de grootste as) en waarbij na okselonderzoek (schildwachtklier of okseluitruiming) geen invasie van de weggenomen klier of klieren te zien is Behandeling volgens de HAS/INCa consensus	1 jaar
Huidkanker	Melanoma <i>in situ</i> zonder micro-infiltratie of niveau Clark I - Volledige excisie - Afwezigheid van dysplastische naevi	1 jaar
Baarmoederhalskanker	Klasse CIN III (of HSIL) of <i>in situ</i> zonder micro-infiltratie Toepassen van een op dat moment aangepaste referentiebehandeling en opvolging volgens HAS-aanbevelingen	1 jaar
Nierkanker	- Clear cell carcinoma van de nier gediagnosticeerd na de leeftijd van 50 jaar, klasse T1N0M0 graad 1 en 2 volgens Führman  - Chromofoob niercelcarcinoom, klasse T1N0M0	8 jaar
		5 jaar
Kankers van de dikke darm en het rectum	Stadium Tis (stadium 0) : - Ouder dan 50 bij de diagnose	1 jaar
	Stadium I : T1N0M0 : - Ouder dan 50 bij de diagnose - Histologisch type: adenocarcinoom	4 jaar 8 jaar
	Stadium I : T2N0M0 : - Ouder dan 50 bij de diagnose - Histologisch type : adenocarcinoom	
Schildklierkanker	Papillair/folliculair < 45 jaar bij de diagnose, stadium I	3 jaar
	Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium I of II	3 jaar
	Papillair/folliculair, 45 jaar of ouder bij de diagnose, stadium III	6 jaar
Hodgkin-lymfomen	Hodgkin-lymfoom stadium 1A na een post-therapeutische opvolgingsperiode	6 jaar
	Hodgkin-lymfoom stadia 1B en 2A na een post-therapeutische opvolgingsperiode	8 jaar

<b>Bijlage 1: referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt (art. 61/3, § 1)</b>		
<b>Type aandoening</b>	<b>Histologische types en referentiestadia- pretherapeutische stadia</b>	<b>Wachttijd vanaf einde actieve behandeling van de kankeraandoening en zonder herval</b>
Acute promyelocyttaire leukemie/APL/AML3	- Ongeacht het aantal leukocyten bij de diagnose - Behandeling beëindigd	3 jaar

We herinneren eraan dat de toegangsvoorwaarden voor een schuldsaldoverzekering op basis van de bovenvermelde termijnen enkel gelden bij afwezigheid van andere risicofactoren of bestaande pathologieën.